治療スケジュール

A-4

*レジメン名	CBDCA+ETP+ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法(21日間)(SCLC)
*投与量・投与日	アテゾリズマブ1200mg/body d1、カルボプラチンAUC5　d1、エトポシド100mg/㎡　d1-3

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	60分	○				
	☆	テセントリク注	1200	mg/body		○				
		1日1回								
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用								
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より30分に短縮可								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	30分	○				
		プロイメンド注	150	mg		○				
		グラニセトロン注	1	mg		○				
		デキサート注	4.95	mg		○				
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○		
		デキサート注	4.95	mg			○	○		
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○		
	☆	エトポシド注	100	mg/㎡		○	○	○		
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○				
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○		
		1日1回								
		流し								
		休薬完了							●	