治療スケジュール

A-6

*レジメン名	CDDP+CPT-11療法(28日間)(SCLC)
*投与量・投与日	イリノテカン 60mg/㎡ d1,d8,d15　シスプラチン60mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○				
		プロイアロカリス点滴静注235mgメンド注	1	V		○				
		パロノセトロン注	0.75	mg						
		デキサート注	9.9	mg						
		1日1回								
		メイン①								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	30分		○	○		
		パロノセトロン注	0.75	mg			○	○		
		デキサート注	6.6	mg			○	○		
		1日1回								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	90分	○	○	○		
	☆	イリノテカン注	60	mg/㎡		○	○	○		
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
		メイン②								
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	90分	○				
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○				
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○				
		1日1回								
		側管②　イリノテカンと同時投与								
通常点滴注射　メインルート		20%マンニットール注	300	mL	30分	○				
		1日1回								
		メイン③								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○				
	☆	シスプラチン注	60	mg/㎡		○				
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
		メイン④								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○				
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○				
		1日1回								
		メイン⑤								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○		
		1日1回								
		休薬完了							●	
		以下別オーダー								
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4					
		1日1回　眠前								
内服		デカドロン錠	8	mg	d2-4					
		1日2回　朝昼食後								