# 治療スケジュール

A-15

| *レジメン名 | CBDCA+S-1療法(21日間)(NSCLC) |
|---|---|
| *投与量・投与日 | カルボプラチン AUC=5 d1、S-1 体表面積＜1.25㎡ 80mg、1.25-1.5㎡ 100mg、1.5㎡＜ 120mg/body/day d1～14 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(21) | d( ) | d( ) | d( ) | d( ) | d( ) | d( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 250 | mL | 30分 | ○ | | | | | | | |
| | | プロイメンド注 | 150 | mg | | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | ○ | | | | | | | |
| | | アロキシ注 | 0.75 | mg | | ○ | | | | | | | |
| | | デキサート注 | 4.95 | mg | | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 250 | mL | 1時間 | ○ | | | | | | | |
| | ☆ | カルボプラチン注 | 5 | AUC | | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | 流し | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | ● | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **以下別オーダー** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | S-1 | 体表面積＜1.25㎡ 80mg、1.25-1.5㎡ 100mg、1.5㎡＜ 120mg/body/day d1～14 | | | | | | | | | | |
| | | 1日2回 朝夕食後 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |