治療スケジュール

A-16

*レジメン名	CDDP+PEM療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ペメトレキセド500mg/㎡ d1、シスプラチン75mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d(　)	d(　)	d(　)
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○							
		パロノセトロン注	0.75	mg									
		デキサート注	9.9	mg									
		1日1回											
		メイン①											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	1000	mL	2時間	○							
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○							
		1日1回											
		側管①　メイン①と同時に開始											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○							
	☆	アリムタ注	500	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		メイン②											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		1日1回											
		メイン③											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○							
	☆	シスプラチン注	75	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		メイン④											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	1000	mL	3時間	○							
		1日1回											
		側管②（側管①に続いて投与）											
通常点滴注射　メインルート		ソルデム3A	500	mL	2時間	○	○	○					
		1日1回											
		メイン⑤(day1)											
側管点滴注射　メインルート		20%マンニットール注射液	300	mL	30分	○							
		1日1回											
		側管③（側管②に続いて投与）											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○	○					
		デキサート注射液	6.6	mg			○	○					
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		ソルラクト	500	mL	2時間		○	○					
		1日1回											
		休薬完了								●			
		以下別オーダー											
筋肉内注射		マスブロン注1mg	1	A	9週間ごと								
		1日1回			アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと（3コースごと）に投与。								
内服		調剤用パンビタン末	1	g	連日								
		1日1回　（葉酸として0.5mg）			アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。								
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4	○	○	○	○				
		1日1回　眠前											
内服		デカドロン錠	8	mg	d4				○				
		1日2回　朝昼食後											