

治療スケジュール

*レジメン名	ドセタキセル＋ラムシルマブ療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ラムシルマブ10mg/kg d1、ドセタキセル 60mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○					
		デキサート注射液	6.6	mg		○					
		ポララミン注 5mg	1	A		○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○					
	☆	サイラムザ注	10	mg/kg		○					
		1日1回									
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より30分に短縮可									
		0.2μmインラインフィルター使用									
		infusion reaction G2以下:投与速度50%へ減速									
		infusion reaction G3以上:中止、かつ再投与なし									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○					
	☆	ドセタキセル注	60	mg/m ²		○					
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
		流し									
		休薬完了					●				