治療スケジュール

A-27

*レジメン名	PEM+BV療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ペメトレキセド500mg/㎡ d1、ベバシズマブ15mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		デキサート注射液	6.6	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○							
	☆	アリムタ注	500	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
	☆	ベバシズマブBS点滴静注	15	mg/kg		○							
		1日1回											
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可											
		それ以降、30分投与とすることができる											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
		休薬完了					●						
		以下別オーダー											
筋肉内注射		マスブロン注1mg	1	A	9週間ごと								
		1日1回			アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。								
内服		調剤用パンビタン末	1	g	連日								
		1日1回 (葉酸として0.5mg)			アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。								