治療スケジュール

A-31

*レジメン名	CBDCA+nab-PTX+ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	ペムブロリズマブ 200mg/body d1、パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 100mg/㎡ d1,8,15、カルボプラチン AUC=6 d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	30分	○							
	☆	キイトルーダ注	200	mg/body		○							
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用											
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
		投与終了後、インラインフィルターなしルートに変更											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	30分	○							
		グラニセトロン注	1	mg		○							
		プロイメンド注	150	mg		○							
		デキサート注	4.95	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○					
		デキサート注	6.6	mg			○	○					
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○					
	☆	アプラキサン注	100	mg/㎡		○	○	○					
		1日1回											
		インラインフィルターは使用しないこと											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○							
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○					
		1日1回											
		流し											
		休薬完了							●				