

治療スケジュール

A-69

*レジメン名	CBDCA+PEM+アミバンタマブ療法(80kg以上)3-4コース(21日)NSCL※全角25文字
*投与量・投与日	ペメトレキセド500mg/m ² d1、カルボプラチンAUC5 d1、アミバンタマブ2100mg d1
*手技	癌 *薬品名・用法・コメント・休薬完了 *数量 *単位 点滴時間・点滴速度 d(1) d(21) d() d() d() d() d() d() d()
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 100 mL 30分 ○
	アロカリス点滴静注235mg 1 V ○
	パロノセトロン注0.75mg 1 V ○
	デキサート注 9.9 mg ○
	1日1回
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 100 mL 10分 ○
☆	アリムタ注 500 mg/m ² ○
	1日1回
	無菌製剤処理料1
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 50 mL 15分 ○
	1日1回
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 250 mL 1時間 ○
☆	カルボプラチン注 5 AUC ○
	1日1回
	無菌製剤処理料1
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 50 mL 15分 ○
	1日1回
通常点滴注射 メインルート	アセリオ点滴静注1000mg 100 mL 15分 ○
	1日1回
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 100 mL 15分 ○
	ファモチジン注射液20mg 1 A ○
	ポラミン注5mg 1 A ○
	1日1回
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 50 mL 15分 ○
	1日1回
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 208 mL 125mL/hで投与 ○
☆	ライブリバント点滴静注 2100 mg ○
	1日1回
	生食250mLから42mL抜き、208mLとして使用
	0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用
	125mL/hで投与
	無菌製剤処理料1
通常点滴注射 メインルート	生理食塩液 50 mL 15分 ○
	1日1回
	流し
	休薬完了 ●
	以下別オーダー
筋肉内注射	シアノコバラミン注1000μg 1 A 9週間ごと アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。
内服	調剤用パンビタン末 1 g 連日 アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。
	1日1回 (葉酸として0.5mg)