

治療スケジュール

A-71

*レジメン名	CBDCA+PEM+アミバンタマブ療法(80kg未満)1コース(21日間)NSCLC					※全角25文字									
*投与量・投与日	ペメトレキセド500mg/m ² d1、カルボプラチンAUC5 d1、アミバンタマブ350mg d1 1050mg d2 1400mg d8,d15														
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(8)	d(15)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○									
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○									
		パロノセトロン注0.75mg	1	V		○									
		デキサート注	19.8	mg		○									
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	10分	○									
	☆	アリムタ注	500	mg/m ²		○									
		1日1回													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	1時間	○									
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○									
		1日1回													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	アセリオ点滴静注1000mg	100	mL	15分	○	○	○	○						
		1日1回													
		体重50kg未満の場合は15mg/kg													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	15分	○									
		ファモチジン注射液20mg	1	A		○									
		ポラミン注5mg	1	A		○									
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○									
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	243	mL	開始時50mL/h→投与開始2時間後75m	○									
	☆	ライブリバント点滴静注	350	mg		○									
		1日1回													
		生食250mLから7mL抜き、243mLとして使用													
		0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用													
		開始時50mL/h、投与開始2時間後75mL/h													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	15分		○								
		ファモチジン注射液20mg	1	A			○								
		ポラミン注5mg	1	A			○								
		デキサート注	9.9	mg			○								
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分		○								
		1日1回													
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	229	mL	開始時33mL/h→投与開始2時間後50mL/hで投		○								
	☆	ライブリバント点滴静注	1050	mg			○								
		1日1回													
		生食250mLから21mL抜き、229mLとして使用													
		0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用													
		開始時33mL/h、投与開始2時間後50mL/h													

[illegible]