

治療スケジュール

A-72

*レジメン名	CBDCA+PEM+アミバンタマブ療法(80kg未満)2コース(21日間)NSCLC					※全角25文字										
*投与量・投与日	ペメトレキセド500mg/㎡ d1、カルボプラチンAUC5 d1、アミバンタマブ1400mg d1															
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○										
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○										
		パロノセトロン注0.75mg	1	V		○										
		デキサート注	9.9	mg		○										
		1日1回														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	10分	○										
	☆	アリムタ注	500	mg/㎡		○										
		1日1回														
		無菌製剤処理料1														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○										
		1日1回														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	1時間	○										
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○										
		1日1回														
		無菌製剤処理料1														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○										
		1日1回														
通常点滴注射	メインルート	アセリオ点滴静注1000mg	100	mL	15分	○										
		1日1回														
		体重50kg未満の場合は15mg/kg														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	15分	○										
		ファモチジン注射液20mg	1	A		○										
		ポラミン注5mg	1	A		○										
		1日1回														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○										
		1日1回														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	222	mL	125mL/hで投与	○										
	☆	ライブリバント点滴静注	1400	mg		○										
		1日1回														
		生食250mLから28mL抜き、222mLとして使用														
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用														
		125mL/hで投与														
		無菌製剤処理料1														
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○										
		1日1回														
		流し														
		休薬完了					●									
		以下別オーダー														
筋肉内注射		シアノコバラミン注1000μg	1	A	9週間ごと											
		1日1回			アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。											
内服		調剤用バンビタン末	1	g	連日											
		1日1回 (葉酸として0.5mg)			アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。											