

A-75

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○							
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液 キイトルーダ注 1日1回 0.2-5μmのインラインフィルターを使用 無菌製剤処理料1	100 200	mL mg/body	30分	○ ○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 パロノセトロン注 デキサート注 アロカリス点滴静注235mg 1日1回	100 0.75 9.9 1	mL mg mg V	30分	○ ○ ○ ○							
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液 アリムタ注 1日1回 無菌製剤処理料1	100 500	mL mg/m²	10分	○ ○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq 硫酸Mg補正液20mEq/20mL 1日1回	500 1 0.4	mL A A	1時間	○ ○ ○							
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液 シスプラチン注 1日1回 無菌製剤処理料1	500 75	mL mg/m²	1時間	○ ○							
通常点滴注射 メインルート		マンニトール注 1日1回	300	mL	30分	○							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq 1日1回 休薬完了	500 1	mL A	1時間	○ ○							
		以下別オーダー											
筋肉内注射		シアノコバラミン注射液 100μg 1日1回	1	A	9週間ごと アリムタ初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、アリムタ投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。								
内服		調剤用パンビタン末 1日1回 (葉酸として0.5mg)	1	g	連日 アリムタ初回投与の7日以上前から連日経口投与。アリムタを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。								
内服		オランザピン錠 1日1回 眼前	5	mg	d1-4	○	○	○	○				
内服		デカドロン錠 1日2回 朝食後	8	mg	d2-4		○	○	○				