

治療スケジュール

A-85

*レジメン名	PEM+セブプリマブ療法(21日間)(NSCLC)													
*投与量・投与日	セブプリマブ 350mg d1、ペムトレキセド 500mg/m ² d1													
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()	d()	
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○								
		1日1回												
		ルート確保												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○								
	☆	リブタヨ点滴静注	350	mg/body		○								
		1日1回				○								
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用												
		無菌製剤処理料1												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○								
		デキサート注射液	6.6	mg		○								
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○								
	☆	ペムトレキセド注	500	mg/m ²		○								
		1日1回												
		無菌製剤処理料1												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○								
		1日1回												
		流し												
		休薬完了					●							
		以下別オーダー												
筋肉内注射		マスブロン注1mg	1	A	9週間ごと									
		1日1回			ペムトレキセド初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、ペムトレキセド投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に投与。									
内服		調剤用パナビタン末	1	g	連日									
		1日1回 (葉酸として0.5mg)			ペムトレキセド初回投与の7日以上前から連日経口投与。ペムトレキセドを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り投与。									