

治療スケジュール

*レジメン名	CBDCA+PTX+セミプロマブ療法(21日間)(NSCLC)											
*投与量・投与日	セミプロマブ350mg/body d1、パクリタキセル200mg/m ² d1、カルボプラチンAUC6 d1											
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		ポララミン注	5	mg		○						
		ファモチジン注	20	mg		○						
		グラニセトロン注	1	mg		○						
		デキサート注	4.95	mg		○						
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液	100	mL	30分	○						
		リブタヨ点滴静注	350	mg/body		○						
		1日1回										
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○						
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○						
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液	500	mL	3時間	○						
		パクリタキセル	200	mg/m ²		○						
		0.22μmフィルター使用										
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート	☆	生理食塩液	250	mL	1時間	○						
		カルボプラチン注	6	AUC		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
		休薬完了					●					