

治療スケジュール

A-88

*レジメン名	CBDCA+PEM+アテゾリス・マブ療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	アテゾリスマブ1200mg d1、カルボプラチンAUC6 d1、ペメトレキセド500mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	60分	○					
	☆	テセントリク点滴静注	1200	mg		○					
		1日1回									
		0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用									
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より30分に短縮可									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○					
		アロカリス点滴静注	1	V		○					
		グラニセトロン注	1	mg		○					
		デキサート注	4.95	mg		○					
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	10分	○					
	☆	ペメトレキセド注	500	mg/m ²		○					
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○					
	☆	カルボプラチン注	6	AUC		○					
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○					
		1日1回									
		流し									
		休薬完了					●				
		以下別オーダー									
筋肉内注射		シアノコバラミン注1mg	1	A	9週間ごと						
		1日1回			ペメトレキセド初回投与の少なくとも7日前に筋肉内注射。その後、 ペメトレキセド投与期間中及び投与中止後22日目まで9週ごと(3 コースごと)に投与。						
内服		調剤用パンビタン末	1	g	連日						
		1日1回 (葉酸として0.5mg)			ペメトレキセド初回投与の7日以上前から連日経口投与。ペメトレキ セドを中止又は終了する場合には、最終投与日から22日目まで可 能な限り投与。						