

治療スケジュール

B-1

*レジメン名	EC療法(21日間)(乳)
*投与量・投与日	エピルビシン90mg/m ² , エンドキサン600mg/m ² , d1

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	開始時速度20mL/hr	○		
		1日1回						
		投与速度適宜調整し、流しにも使用						
		エピルビシン点滴開始60分前にアプレピタント内服						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
		デキサート注	9.9	mg		○		
		アロキシ注	0.75	mg		○		
		1日1回						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エピルビシン注	90	mg/m ²		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エンドキサン注	600	mg/m ²		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1(揮発性)						
		休薬完了					●	
		以下別オーダー						
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1			
		1日1回 エピルビシン開始60分前						
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3			
		1日1回 朝食後						
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2,3,4			
		1日2回 朝昼食後						