治療スケジュール

B-5

*レジメン名	ダトポタマブデルクステカン療法（21日間）（乳）
*投与量・投与日	ダトポタマブデルクステカン 6mg/kg d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d（1）	d（21）	d（ ）	d（ ）	d（ ）	d（ ）	d（ ）
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○						
		デキサート注	9.9	mg		○						
		パロノセトロン注	0.75	mg		○						
		ファモチジン注	20	mg		○						
		ポララミン注	5	mg		○						
		1日1回										
		点滴開始時、カロナール500mg 1錠内服										
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	90分	○						
		注射用水	0.3	mL/kg		○						
	☆	ダトロウェイ点滴静注用	6	mg/kg		○						
		1日1回										
		0.2μmフィルター使用										
		初回忍容性良好であれば2回目以降30分まで短縮可										
		点滴バックを遮光すること。										
		調製後、4時間以内に投与完了すること。										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	15分	○						
		1日1回										
		流し										
		休薬完了					●					
		以下別オーダー										
内服		カロナール錠	500	mg	day1							
		ダトロウェイ投与前										
内服		デカドロン錠	8	mg	day2,3							
		1日2回朝昼食後										