

治療スケジュール

B-20

*レジメン名	wPTx+wトラスツズマブ療法【初回】(21日間)(乳)
*投与量・投与日	トラスツズマブD1 4mg/kg D8.15 2mg/kg パクリタキセル 80mg/m ² , D1.8.15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	90分	○			
	☆	トラスツズマブ	4	mg/kg		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	90分		○	○	
	☆	トラスツズマブ	2	mg/Kg			○	○	
		1日1回							
		忍容性良好であれば30分まで短縮可							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○	
		ファモチジン注	1	V		○	○	○	
		1日1回							
		開始時レスタミンコーワ10mg錠 5錠内服							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	○	
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	1時間	○	○	○	
	☆	パクリタキセル	80	mg/m ²		○	○	○	
		1日1回							
		0.22μmフィルター使用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		1日1回							
		休薬完了							●
		以下別オーダー							
内服		レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	d1.8.15				
		1日1回 3本目の点滴開始時							