

治療スケジュール

B-23

*レジメン名	wPTx(90mg/m ²)+BV療法(28日間)(乳)
*投与量・投与日	パクリタキセル 90mg/m ² D1, 8, 15、ペバシズマブ 10mg/kg D1, 15、

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○		○	
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○		○	
	☆	ペバシズマブBS点滴静注 1日1回	10	mg/kg		○		○	
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可 それ以降、30分投与とすることができる 無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	
		デキサート注	6.6	mg		○	○	○	
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○	
		1日1回 開始時にレスタミンコーワ10mg錠 5錠内服							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	100	mL	30分	○	○	○	
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○	○	
	☆	パクリタキセル 1日1回	90	mg/m ²		○	○	○	
		0.22μmフィルター使用 無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 1日1回	50	mL	15分	○	○	○	
		休薬完了							●
		以下別オーダー							
内服		レスタミンコーワ錠10mg 1日1回 1本目の点滴開始時	5	錠	d1.8.15				