

*レジメン名	【術前】ペムブロリスマブ+EC療法(21日間)(乳)	※全角25文字
*投与量・投与日	ペムブロリスマブ 200 d1 エピルビシン 90mg/m ² d1 エンドキサン 600mg/m ² d1	

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
		ルート確保						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	キイトルーダ点滴静注	200	mg/body		○		
		1日1回						
		0.2-5μmのインラインフィルターを使用						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
		デキサート注	9.9	mg		○		
		パロノセトロン注	0.75	mg		○		
		アロカリス点滴静注	1	V				
		1日1回						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エピルビシン注	90	mg/m ²		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		
	☆	エンドキサン注	600	mg/m ²		○		
		1日1回						
		無菌製剤処理料1(揮発性)						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○		
		1日1回						
		流し						
		休薬完了					●	
以下別オーダー								
内服		デカドロン錠	8	mg	d2,3,4			
		1日2回 朝昼食後						
内服		オランザピン錠	5	mg	d1,2,3,4			
		1日1回 夕食後						