

治療スケジュール

B-35

*レジメン名	サシツズマブゴビテカン療法【継続】(21日間)(乳)
*投与量・投与日	サシツズマブ ゴビテカン 10mg/kg day1,8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(21)
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	
		デキサート注射液	9.9	mg				
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V				
		ポララミン注	1	A				
		ファモチジン注	20	mg				
		1日1回						
		点滴開始時にカロナール錠500mg1錠内服						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	
		1日1回						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○	
	☆	トロデルビ点滴静注用	10	mg/kg		○	○	
		1日1回						
		無菌製剤処理料1						
		前回投与時に忍容性不良であった場合には投与時間を1時間へ短縮せず主治医に確認する						
		トロデルビ275mg未満の場合は生食100mLに変更する						
		トロデルビ850mgを超える場合は生食500mLに変更する						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○	
		1日1回						
		休薬完了						●
		以下別オーダー						
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1、8			
		1日1回 トロデルビ投与前						
内服		デカドロン錠	8	mg	day2・3、9・10			
		1日2回 朝昼食後						