レジメン登録フォーマット

C-12

*レジメン名	CBDCA+5-FU+Cmab療法(1コース目)(21日間)(頭頸部)
*投与量・投与日	カルボプラチン AUC5 day1, フルオロウラシル 1000 mg/㎡/day day1-4 セツキシマブ 400mg/㎡ day1, 250mg/㎡ day8,15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		ロック用生食	10	mL		○	○	○						
		1日1回												
		開始時 CVポートフラッシュ												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	30分	○								
		ポララミン注5mg	1	A		○								
		デキサート注	4.95	mg		○								
		パロノセトロン注0.75mg	1	A		○								
		アロカリス点滴静注 235mg	1	V		○								
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○								
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分		○	○						
		ポララミン注5mg	1	A			○	○						
		デキサート注	6.6	mg			○	○						
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	500	mL	2時間	○								
	☆	アービタックス注	400	mg/㎡		○								
		無菌製剤処理料1												
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	1時間		○	○						
	☆	アービタックス注	250	mg/㎡			○	○						
		無菌製剤処理料1												
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○								
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	1時間	○								
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○								
		無菌製剤処理料1												
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○								
		1日1回												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	4日間 2mL/h	○								
	☆	フルオロウラシル注	4000	mg/㎡		○								
		1日1回												
		全量192mLに。(Infusor LV2)												
		無菌製剤処理料1												
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)												
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	1時間		○	○						
		流し+経過観察												
		1日1回												
		休薬完了							●					