レジメン登録フォーマット

C-13

*レジメン名	CBDCA+5-FU+Cmab療法(2-6コース目)(21日間)(頭頸部)
*投与量・投与日	カルボプラチン AUC5 day1, フルオロウラシル 1000 mg/㎡/day day1-4 セツキシマブ 250mg/㎡ day1,8,15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		ロック用生食	10	mL		○	○	○			
		1日1回									
		開始時 CVポートフラッシュ									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	30分	○					
		ポララミン注5mg	1	A		○					
		デキサート注	4.95	mg		○					
		パロノセトロン注0.75mg	1	A		○					
		アロカリス点滴静注 235mg	1	V		○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分		○	○			
		ポララミン注5mg	1	A			○	○			
		デキサート注	6.6	mg			○	○			
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	1時間	○	○	○			
	☆	アービタックス注	250	mg/㎡		○	○	○			
		無菌製剤処理料1									
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	1時間	○					
	☆	カルボプラチン	5	AUC		○					
		無菌製剤処理料1									
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○					
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	4日間 2mL/h	○					
	☆	フルオロウラシル	4000	mg/㎡		○					
		全量192mLに。(Infusor LV2)									
		無菌製剤処理料1									
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	1時間		○	○			
		流し+経過観察									
		1日1回									
		休薬完了							●		