治療スケジュール

E-4

*レジメン名	トラスツズマブ+S-1+CDDP療法【初回】(21日間)(胃)
*投与量・投与日	トラスツズマブ　初回　8mg/kg、2回目以降　6mg/kg　d1、CDDP 60mg/㎡　d1、TS－1 体表面積＜1.25㎡　80mg、1.25-1.5㎡　100mg、1.5㎡＜　120mg/body/day　d1～d14

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(21)	d( )	d( )	d( )
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1輸液	500	mL	6時間	○	○	○					
		1日1回											
		メイン											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	90分	○							
	☆	トラスツズマブBS注	8	mg/kg		○							
		1日1回											
		側管											
		無菌製剤処理料1											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	30分	○							
		デキサート注射液	9.9	mg		○							
		アロキシ注	1	V		○							
		1日1回											
		開始時アプレピタントカプセル服用											
		側管											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○	○				
		デキサート注射液	6.6	mg			○	○	○				
		1日1回　朝											
		側管											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム3A輸液	500	mL	6時間	○	○	○					
		1日1回											
		メイン											
側管点滴注射　メインルート		マンニットール注	300	mL	30分	○							
		1日1回											
		側管											
		メインを止めて点滴											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○							
	☆	シスプラチン点滴静注	60	mg/㎡		○							
		1日1回											
		側管											
		無菌製剤処理料1											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム1輸液	500	mL	6時間	○	○	○					
		1日1回											
		メイン											
持続点滴注射　メインルート		ソルデム3A輸液	500	mL	6時間	○	○	○					
		1日1回											
		メイン											
		休薬完了								●			
		以下別オーダー											
内服	☆	S-1	体表面積＜1.25㎡　80mg、1.25-1.5㎡　100mg、1.5㎡＜　120mg/body/day　d1～d14										
		1日2回　朝夕食後											
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	d1								
		1日1回　3本目の点滴開始時											
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	d2,3								
		1日1回　朝食後											
内服		ロラゼパム錠0．5mg	1	錠	d0眠前、d1朝								