

治療スケジュール

*レジメン名	S-1+CDDP(60mg/m ²)療法(35日間)(胃)
*投与量・投与日	CddP 60mg/m ² d8 TS-1 80mg/m ² d1~d21

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(8)	d(9)	d(10)	d(11)	d(35)	d()	d()
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 アロキシン注 1日1回 開始時アプレピタントカプセル服用 側管	250 9.9 1	mL mg V	60分	○ ○ ○						
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 デキサート注射液 1日1回 朝 側管	50 6.6	mL mg	15分		○ ○	○ ○	○ ○			
側管点滴注射	メインルート	マンニトール注 1日1回 側管 メインを止めて点滴	300	mL	30分	○						
側管点滴注射	メインルート	生理食塩液 ☆ シスプラチン点滴静注 1日1回 側管 無菌製剤処理料1	500 60	mL mg/m ²	2時間	○ ○						
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
持続点滴注射	メインルート	ソルデム1輸液 1日1回 メイン	500	mL	6時間	○	○	○				
持続点滴注射	メインルート	ソルデム3A輸液 1日1回 メイン 休薬完了	500	mL	6時間		○	○				●
以下別オーダー												
内服	☆	S-1 1日2回 朝夕食後	80	mg/m ²	d1~d21							
内服		アプレピタントカプセル 1日1回 2本目の点滴開始時	125	mg	d8							
内服		アプレピタントカプセル 1日1回 朝食後	80	mg	d9.10							
内服		ロラゼパム錠0.5mg	1	錠	d7眠前、d8朝							