

治療スケジュール

E-13

| | |
|----------|--|
| *レジメン名 | S-1+ドセタキセル療法(21日間)(胃) |
| *投与量・投与日 | ドセタキセル 40mg/m ² d1、S-1 80mg/m ² d1~d14 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(21) | d() | d() |
|---------------|---|---------------------|-----|-------------------|-----------|------|-------|------|------|
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | |
| | | デキサート注射液 | 6.6 | mg | | ○ | | | |
| | | ファモチジン注 | 20 | mg | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | |
| | | ポララミン注 5mg | 1 | A | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 5%ブドウ糖注 | 250 | mL | 90分 | ○ | | | |
| | ☆ | ドセタキセル注 | 40 | mg/m ² | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | |
| 通常点滴注射 メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 20分 | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| | | 流し | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | ● | |
| | | 以下別オーダー | | | | | | | |
| 内服 | ☆ | S-1 | 80 | mg/m ² | d1~d14 | | | | |
| | | 1日2回 朝夕食後 | | | | | | | |