

治療スケジュール

*レジメン名	ラムシルマブ+パクリタキセル療法(28日間)(胃)
*投与量・投与日	ラムシルマブ 8mg/kg (day1,15)、パクリタキセル 80mg/m ² (day1,8,15)

*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○	○	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○	○			
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○			
		ポララミン注 3mg	1	A		○	○	○			
		1日1回									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	全開	○		○			
		1日1回									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	ml	30分		○				
		1日1回									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	ml	60分	○		○			
	☆	サイラムザ	8	mg/kg		○		○			
		1日1回									
		0.2 μmインラインフィルター使用									
		infusion reaction G2以下:投与速度50%へ減量									
		infusion reaction G3以上:中止、かつ再投与なし									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○		○			
		1日1回									
		流し									
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖液	250	ml	60分	○	○	○			
	☆	パクリタキセル	80	mg/m ²		○	○	○			
		1日1回									
		0.22 μmフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	ml	15分	○	○	○			
		1日1回									
		流し									
		休薬完了							●		