

治療スケジュール

*レジメン名	ニボルマブ+SOX療法(21日間)(胃)								
*投与量・投与日	オキサリプラチン 130mg/m ² d1、 S-1 80mg/m ² d1~d14								
*手技	癌	*薬品名**用法・コメント**休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		ルート確保							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○			
	☆	オブジーボ注	360	mg/body		○			
		1日1回							
		30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて							
		オブジーボ36mLを注入し、総量100mLにする							
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○			
		パロノセトロン注0.75mg	1	V		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		ポララミン注5mg	1	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
	☆	オキサリプラチン点滴静注用	130	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	25分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服	☆	S-1	80	mg/m ²	d1~d14				
		1日2回 朝夕食後							
内服		デカドロン錠	8	mg	d2,3				
		1日2回 朝昼食後							