

治療スケジュール

E-31

*レジメン名	ニボルマブ+XELOX療法(21日間)(胃)
*投与量・投与日	オプジーボ 360mg/body d1、オキサリプラチン 130mg/m ² d1、ゼローダ 2000mg/m ² d1夕～d15朝

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		ルート確保							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○			
	☆	オプジーボ注	360	mg/body		○			
		1日1回							
		30kg未満の場合は、生食100mLから36mL抜いて							
		オプジーボ36mLを注入し、総量100mLにする							
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○			
		パロノセトロン注0.75mg	1	V		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		ポラミン注5mg	1	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服	☆	ゼローダ錠	2000	mg/m ²	d1夕～d15朝				
		1日2回 朝夕食後							
内服		デカドロン錠	8	mg	d2,3				
		1日2回 朝昼食後							