治療スケジュール

E-38

*レジメン名	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ+mFOLFOX6療法【継続】(14日間)(胃)
*投与量・投与日	ｿﾞﾙﾍﾞﾂｷｼﾏﾌﾞ400mg/㎡ d1、ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ 200mg/㎡ d1、ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 85mg/㎡ d1、5-Fu 400mg/㎡ d1、5-Fu 2400mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		ロック用生食	10	mL		○						
		1日1回										
		開始時　CVポートフラッシュ										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	30分	○						
		デキサート注射液	9.9	mg		○						
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○						
		パロノセトロン0.75mg注	1	V		○						
		ポララミン注5mg	1	A		○						
		1日1回										
		メイン①										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
		メイン②										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	180	mL/㎡		○						
	☆	ビロイ点滴静注用	400	mg/㎡		○						
		注射用水100mL	20	mL/㎡		○						
		1日1回										
		ビロイ1Vあたり注射用水5mLで溶解する										
		ビロイ2mg/mLに濃度調整										
		ビロイは払い出しの直前に調製する。入院の場合は病棟へ連絡し、投与開始時間を確認する。										
		2時間以上かけて投与すること										
		調製後、6時間以内に投与完了する										
		やむを得ず保存する場合は2-8℃で保存し24時間以内に使用する										
		0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用										
		無菌製剤処理料1										
		メイン③										
		【投与速度】										
		最初の1時間は体表面積×25mL/hrで投与										
		次の1時間は体表面積×50mL/hrで投与										
		最後は体表面積×75mL/hrで投与										
		【悪心出現時】										
		悪心が出現した際は投与を中断せずにメトクロプラミド注10mg1Aを側管から投与する										
		悪心が続く場合、嘔吐が出現した場合は投与を中断する										
		回復後、症状が出現した際の投与速度より1段階前の速度で投与する										
		最初の1時間に中断した場合は、体表面積×12.5mL/hrで投与										
		投与再開後、再開した速度から順に1時間毎に体表面積×(12.5→25→50→75)mL/hrの順で速度を上げる										
		再度、悪心嘔吐が出現した場合は投与を中断し、主治医の指示に従う										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○						
		1日1回										
		メイン④										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○						
		レボホリナート点滴注	200	mg/㎡		○						
		1日1回										
		側管⑤										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○						
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/㎡		○						
		1日1回										
		メイン⑤　側管⑤と併流										
		無菌製剤処理料1										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	5分	○						
	☆	フルオロウラシル注	400	mg/㎡		○						
		1日1回										
		メイン⑥										
		無菌製剤処理料1										
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間　3.7mL/h	○						
	☆	フルオロウラシル注	2400	mg/㎡		○						
		1日1回										
		全量140mLに。(トレフューザー typeT)										
		メイン⑦										
		無菌製剤処理料1										
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)										
		休薬完了					●					
		以下別オーダー										
内服		デカドロン錠	8	mg	day2～4							
		1日2回　朝昼食後										
		オランザピン錠	5	mg	day0～4							
		1日1回　夕食後										