# 治療スケジュール

F-14

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | LV5FU(RPMI)療法(56日間)(大腸) |
| *投与量・投与日 | 5FU 600mg/㎡ ・レボホリナート250mg/㎡　d1、8、15、22、29、36 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(8) | d(15) | d(22) | d(29) | d(36) | d(56) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | デキサート注射液 | 6.6 | mg | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | メイン | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート | | 5%ブドウ糖注 | 250 | mL | 2時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | レボホリナート点滴注 | 250 | mg/㎡ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | メイン | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 側管点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | ☆ | フルオロウラシル注 | 600 | mg/㎡ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | I－LV開始1時間後、全開で点滴 | | | | | | | | | | | |
| | | 側管 | | | | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 25分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | | | | |
| | | メイン　流し | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | | | | | ● | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |