治療スケジュール

F-15

*レジメン名	mFOLFOX6療法(14日間)(大腸)
*投与量・投与日	レボホリナート200mg/㎡ d1、　オキサリプラチン85mg/㎡ d1、　5Fu400mg/㎡ d1、　5Fu2400mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(3)	d(14)	d(　)	d(　)
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		ロック用生食	10	mL		○				
		1日1回								
		開始時　CVポートフラッシュ								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		デキサート注射液	6.6	mg		○				
		グラニセトロン静注液　1mg	1	A		○				
		1日1回								
		メイン①								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		ポララミン注　5mg/1mL	1	A		○				
		1日1回								
		メイン②								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○				
		レボホリナート点滴注	200	mg/㎡		○				
		1日1回								
		側管③								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○				
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/㎡		○				
		1日1回								
		メイン③　側管③と併流								
		無菌製剤処理料1								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	5分	○				
	☆	フルオロウラシル注	400	mg/㎡		○				
		1日1回								
		メイン④								
		無菌製剤処理料1								
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間　3.7mL/h	○				
	☆	フルオロウラシル注	2400	mg/㎡		○				
		1日1回								
		全量140mLに。(トレフューザー typeT)								
		メイン⑤								
		無菌製剤処理料1								
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2・3					
		1日2回　朝昼食後								