

治療スケジュール

*レジメン名	Pmab+mFOLFOX6療法(14日間)(大腸)											
*投与量・投与日	レボホリナート200mg/m ² d1、オキサリプラチン85mg/m ² d1、5Fu400mg/m ² d1、5Fu2400mg/m ² d1、ベクティビックス6mg/kg d1											
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d()	d()	d()	d()	d()
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生食注シリンジ 1日1回 開始時 CVポートフラッシュ	10	mL		○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液 デキサート注射液 グラニセトロン 1mg 1日1回 メイン①	50 9.9 1	mL mg A	15分	○ ○ ○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液 ボラミン注 1日1回 メイン②	50 1	mL A	15分	○ ○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液 ベクティビックス 1日1回 メイン③ 0.2又は0.22µmフィルター使用 ベクティビックス開始から2時間要観察 無菌製剤処理料1	100 6	mL mg/kg	60分	○ ○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液 1日1回 メイン④	50	mL	15分	○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注 レボホリナート点滴注 1日1回 メイン⑤	250 200	mL mg/m ²	2時間	○ ○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注 ☆ オキサリプラチン点滴静注液 1日1回 側管⑤ 無菌製剤処理料1	250 85	mL mg/m ²	2時間	○ ○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液 ☆ フルオロウラシル 1日1回 側管⑥ 無菌製剤処理料1	50 400	mL mg/m ²	5分	○ ○						
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液 ☆ フルオロウラシル 1日1回 全量100mL(Infusor SV2.5) メイン⑦ 無菌製剤処理料1 携帯型ディスプレイ注入ポンプ(化学療法用) 休薬完了	100 2400	mL mg/m ²	46時間 2.5mL/h	○ ○						
		以下別オーダー										
内服		デカロン錠(0.5mg) 1日2回 朝食後	16	錠	d2,3							