

治療スケジュール

F-19

*レジメン名	sLV5FU2療法(14日間)(大腸)
*投与量・投与日	5FU 400mg/m ² ・5FU 2400mg/m ² /46時間・レボホリナート200mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d()	d()
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生食注シリンジ	10	mL		○			
		1日1回							
		開始時 CVポートフラッシュ							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○			
		1日1回							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
		レボホリナート点滴注	200	mg/m ²		○			
		1日1回							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	5分	○			
	☆	フルオロウラシル注	400	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間 2.5mL/h	○			
	☆	フルオロウラシル注	2400	mg/m ²		○			
		1日1回							
		全量100mLに。(Infusor SV2.5)							
		無菌製剤処理料1							
		携帯型ディスポーザブル注入ポンプ(化学療法用)							
		休薬完了						●	
		以下別オーダー							
内服		デカドロン錠(0.5mg)	8	錠	day2・3				
		1日2回 朝昼食後							