

治療スケジュール

F-22

*レジメン名	CapeOX療法(21日間)(大腸)
*投与量・投与日	オキサリプラチン 130mg/m ² d1、ゼローダ 2000mg/m ² d1~d14

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	6.6	mg		○			
		パノノセトロン0.75mg注	1	V		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○			
		ポラミン注5mg	1	A		○			
		1日1回							
通常点滴注射	メインルート	5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	130	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	25分	○			
		1日1回							
		流し							
		休薬完了					●		
		以下別オーダー							
内服	☆	ゼローダ錠	2000	mg/m ²	d1~14				
		1日2回 朝夕食後							
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2・3				
		1日2回 朝昼食後							