

治療スケジュール

F-24

*レジメン名	BV(10mg/kg)+mFOLFOX6療法(14日間)(大腸)								
*投与量・投与日	レボホリナート200mg/m <sup>2</sup> d1、オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup> d1、 5Fu400mg/m <sup>2</sup> d1、 5Fu2400mg/m <sup>2</sup> d1、 アバスチン10mg/kg d1								
*手技	癌	*薬品名*用法*コメント*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(14)	d( )	d( )
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生食注シリンジ	10	mL		○			
		1日1回							
		開始時 CVポートフラッシュ							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		デキサート注射液	9.9	mg		○			
		グラニセトン静注液 1mg	1	A		○			
		1日1回							
		メイン①							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	90分	○			
	☆	アバスチン注	10	mg/kg		○			
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可							
		それ以降、30分投与とすることができる							
		1日1回							
		メイン②							
		無菌製剤処理料1							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	15分	○			
		ボラミン注	1	A		○			
		1日1回							
		メイン③							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
		レボホリナート点滴注	200	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		メイン④							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		5%ブドウ糖注	250	mL	2時間	○			
	☆	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		側管④							
		無菌製剤処理料1							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	50	mL	5分	○			
	☆	フルオウラシル注	400	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		側管⑤							
		無菌製剤処理料1							
抗悪性腫瘍剤局所持続注入		生理食塩液	100	mL	46時間 2.5mL/h	○			
	☆	フルオウラシル注	2400	mg/m <sup>2</sup>		○			
		1日1回							
		全量100mLに。(Infusor SV2.5)							
		メイン⑥							
		無菌製剤処理料1							
		携帯型ディスプレイ注ポンプ(化学療法用)							
		休薬完了							●
		以下別オーダー							
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	d2,3				
		1日2回 朝食後							