治療スケジュール

G-2

*レジメン名	ゲムシタビン＋CDDP療法（21日間）（胆道）
*投与量・投与日	CDDP　25mg/㎡　d1・8、ゲムシタビン　1000mg/㎡　d1・8

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d（1）	d（8）	d（21）	d（　）	d（　）
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○			
		デキサート注射液	4.95	mg		○	○			
		グラニセトロン静注液　1mg	1	A		○	○			
		1日1回								
		点滴開始時にアプレピタントカプセル服用								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○	○			
	☆	ゲムシタビン注射用	1000	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○	○			
	☆	シスプラチン注	25	mg/㎡		○	○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○			
		1日1回								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day1・8					
		1日1回　朝1本目の点滴開始時								
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day2・3・9・10					
		1日1回　朝食後								
内服		デカドロン錠（0.5mg）	8	錠	day2・3・9・10					
		1日2回　朝昼食後								