治療スケジュール

H-2

*レジメン名	CPT-11+CDDP療法（28日間）（子宮頚）
*投与量・投与日	シスプラチン 60mg/㎡ d1　イリノテカン 60mg/㎡ d1･d8･d15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(8)	d(15)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート①		ソリューゲンF	500	mL	1時間	○							
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート②		ソルデム3A	500	mL	1時間	○							
		フロセミド 20mg	1	A		○							
		1日1回											
		開始時にアプレピタントカプセル服用											
									(d8･15:メイン①)				
通常点滴注射　メインルート③		生理食塩水	100	mL	30分	○			○	○			
		グラニセトロン 1mg	1	A		○			○	○			
		デキサート注	9.9	mg		○			○	○			
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート④		生理食塩水	500	mL	2時間	○							
	☆	シスプラチン	60	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート⑤		生理食塩水	50	mL	15分	○							
		1日1回											
									(d8･15:メイン②)				
通常点滴注射　メインルート⑥		生理食塩水	500	mL	2時間	○			○	○			
	☆	イリノテカン	60	mg/㎡		○			○	○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
							(d2･3:メイン①)						
通常点滴注射　メインルート⑦		ソリューゲンF	500	mL	90分	○	○	○					
		L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K点滴静注液　10mEq	10	mEq		○	○	○					
		フロセミド 20mg	1	A		○	○	○					
		1日1回											
							(d2･3:メイン②)						
通常点滴注射　メインルート⑧		ソルデム3A	500	mL	90分	○	○	○					
		1日1回											
							(d2:メイン③)						
通常点滴注射　メイン①		ソリューゲンF	500	mL	90分		○						
(d-2)		1日1回											
							(d2:メイン④、d3:メイン③)						
通常点滴注射　メインルート		ソルデム3A	500	mL	90分		○	○					
(d-2、d-3)		1日1回											
									(d8･15:メイン③)				
通常点滴注射　メインルート		生理食塩水	50	mL	90分				○	○			
(d-8、d-15)		1日1回											
		休薬完了									●		
		以下別オーダー											
内服		炭酸水素ナトリウム	○		d1-4								
内服		ウルソ	○		d1-4								
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1								
		1日1回　2本目の点滴開始時											
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3								
		1日1回　朝食後											
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2-4･9･10･16･17								
		1日2回　朝昼食後											