治療スケジュール

H-10

*レジメン名	BEP療法(21日間)(卵巣胚細胞腫瘍)
*投与量・投与日	シスプラチン 20mg/㎡ d1-d5、 エトポシド 100mg/㎡ d1-d5、ブレオマイシン 20mg/㎡(max 30mg/body) d2,d9,d16

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(9)	d(16)	d(21)
通常点滴注射 メインルート		ソリューゲンF	500	mL	1時間	○	○	○	○	○			
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	1時間	○	○	○	○	○			
		フロセミド 20mg	1	A		○	○	○	○	○			
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	30分	○	○	○	○	○			
		グラニセトロン	1	mg		○	○	○	○	○			
		デキサート	13.2	mg		○	○	○	○	○			
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分						○	○	
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	30分		○				○	○	
	☆	ブレオマイシン	20	mg/㎡			○				○	○	
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分		○						
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	500	mL	2時間30分	○	○	○	○	○			
	☆	エトポシド	100	mg/㎡		○	○	○	○	○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	○	○	○	○	○			
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	250	mL	1時間30分	○	○	○	○	○			
	☆	シスプラチン	20	mg/㎡		○	○	○	○	○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	90分	○	○	○	○	○			
		フロセミド 20mg	1	A		○	○	○	○	○			
		L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸K点滴静注液10mEq	1	A		○	○	○	○	○			
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	90分	○	○	○	○	○			
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分						○	○	
		1日1回											
		休薬完了											●
		以下別オーダー											
内服		デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day6-8								
		1日2回 朝昼食後											