

第2日目										
通常点滴注射	メインルート	ソルデム3A 7%メイロン 20mL 1日1回 メイン①	500 mL 2 A	5時間						○ ○
静脈内注射		ロイコボリン注 3mg 1日1回 午前10時	5 A							○
側管点滴注射	メインルート	生理食塩水 グラニセトロン 1mg デキサート 1日1回 側管①	100 mL 1 A 9.9 mg	30分						○ ○ ○
側管点滴注射	メインルート	生理食塩水 ☆ コスメゲン 蒸留水 20mL 1日1回 蒸留水 1.1mLでコスメゲン1Vを溶解 0.5mg/mLに 無菌製剤処理料1 側管②	50 mL 0.5 mg/body 1 A	15分						○ ○ ○ (コスメゲン溶解用)
側管点滴注射	メインルート	生理食塩水 1日1回 側管③	50 mL	15分						○
側管点滴注射	メインルート	生理食塩水 ☆ エトボシド 1日1回 無菌製剤処理料1 側管④	250 mL 100 mg/body	1時間						○ ○
側管点滴注射	メインルート	生理食塩水 1日1回 ルート洗浄終了後、ルートロック 側管⑤	50 mL	15分						○
静脈内注射		ロイコボリン注 3mg 1日1回 22時	5 A							○
第3-5日目										
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水 グラニセトロン 1mg デキサート 1日1回 メイン①	100 mL 1 A 9.9 mg	30分						○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
静脈内注射		ロイコボリン注 3mg 1日1回 午前10時	5 A							○
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水 ☆ コスメゲン 蒸留水 20mL 1日1回 蒸留水 1.1mLでコスメゲン1Vを溶解 0.5mg/mLに 無菌製剤処理料1 メイン②	50 mL 0.5 mg/body 1 A	15分						○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (コスメゲン溶解用)
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水 1日1回 メイン③	50 mL	15分						○
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水 ☆ エトボシド 1日1回 無菌製剤処理料1 メイン④	500 mL 100 mg/body	2時間						○ ○ ○ ○ ○ ○
通常点滴注射	メインルート	生理食塩水 1日1回 ルート洗浄終了後、ルートロック メイン⑤	50 mL	15分						○ ○ ○
休薬完了										
以下別オーダー										
内服		デカドロン錠(0.5mg) 1日2回 朝食後	16 錠	day6・7						