治療スケジュール

H-28

*レジメン名	CPT-11療法(28日間)(卵巣)
*投与量・投与日	イリノテカン100mg/㎡ d1、8、15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○			
		デキサート注射液	3.3	mg		○	○	○			
		グラニセトロン静注液　1mg	1	A		○	○	○			
		1日1回									
		点滴開始1時間前にアプレピタントカプセル服用									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○			
	☆	イリノテカン注	100	mg/㎡		○	○	○			
		1日1回									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○			
		1日1回									
		流し									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服		アプレピタントCap	125	mg	d1・8・15						
		1日1回　1本目の点滴開始1時間前									
内服		アプレピタントCap	80	mg	d2,3・9,10・16,17						
		1日1回　朝食後									