レジメン登録フォーマット

H-29

*登録診療科	産婦人科				
*申請医師	望月医師				
*レジメン名	TC+BV療法(21日間)(卵巣)	※全角25文字			
*疾患名	卵巣癌	*適応患者	卵巣癌Ⅲ期以上	*適用区分	入院・外来
*投与量・投与日	パクリタキセル175mg/㎡ d1、カルボプラチンAUC5 d1、アバスチン15mg/kg d1				
コメント	ｱﾙｺｰﾙｱﾚﾙｷﾞｰ確認。d1ﾚｽﾀﾐﾝ10mg5錠内服。2回目～ｱﾊﾞｽﾁﾝ投与時間短縮可。AUC=5で登録。ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠d2･3に8m	※全角50文字			
最大投与(ｸｰﾙ)回数	6	最大累積投与量			
*インターバル日数	21日	*有効日付	2020.1. ～		

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート①		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		デキサート注	19.8	mg		○							
		ファモチジン注	20	mg		○							
		1日1回											
		点滴開始時にレスタミンコーワ錠5錠内服											
通常点滴注射 メインルート②		生理食塩液	50	mL	30分	○							
		グラニセトロン注	1	mg		○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート③		生理食塩液	500	mL	3時間	○							
	☆	パクリタキセル注	175	mg/㎡		○							
		1日1回											
		0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート④		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		流し											
通常点滴注射 メインルート⑤		生理食塩液	250	mL	1時間	○							
	☆	カルボプラチン注	5	AUC		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート⑥		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート⑦		生理食塩液	100	mL	90分	○							
	☆	アバスチン注	15	mg/kg		○							
		1日1回											
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可											
		それ以降、30分投与とすることができる											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート⑧		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		休薬完了							●				
		以下別オーダ											
内服		レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	d1 朝	○							
		1日1回 1本目の点滴開始時											