

治療スケジュール

H-33

*レジメン名	BV+リポ化ドキソルビシン療法(28日間)(卵巣)
*投与量・投与日	アバスチン 15mg/kg d1、リポ化ドキソルビシン 40mg/m ² d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(28)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	90分	○			
	☆	アバスチン注	15	mg/kg		○			
		1日1回							
		インフュージョンリアクション認めなければ次回より60分に短縮可							
		それ以降、30分投与とすることができる							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○			
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	30分	○			
		デキサート注	6.6	mg		○			
		グラニセトン注	1	mg		○			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	250	mL	2時間	○			
	☆	ドキシル注	40	mg/m ²		○			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		5%ブドウ糖液	100	mL	30分	○			
		1日1回							
		休薬完了					●		