# 治療スケジュール

I-24

| | |
|---|---|
| *レジメン名 | ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ400mg+ｴﾝﾎﾙﾂﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ療法(42日)尿路上皮 |
| *投与量・投与日 | キイトルーダ 400mg/body d1、パドセブ　1.25mg/kg d1,8,22,29 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(8) | d(22) | d(29) | d(42) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | デキサート注 | 6.6 | mg | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 注射用水20mL | 1 | A | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | ☆ | パドセブ点滴静注用 | 1.25 | mg/kg | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | |
| | | パドセブ1Vあたり注射用水3.3mLで溶解 | | | | | | | | |
| | | ｴﾝﾎﾙﾂﾏﾌﾞ ﾍﾞﾄﾞﾁﾝ 最大投与量　125mg/body | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 30分 | ○ | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | |
| | | パドセブの忍容性が良好の場合、次回より15分に短縮可 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | ○ | | | | |
| | ☆ | キイトルーダ点滴静注 | 400 | mg/body | | ○ | | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | |
| | | 0.2-5μmのインラインフィルターを使用 | | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 通常点滴注射　メインルート | | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1日1回 | | | | | | | | |
| | | 流し | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | | | ● |
| | | | | | | | | | | |