治療スケジュール

J-6

*レジメン名	R-CHOP(day1,2)療法(21日間)(悪性ﾘﾝﾊﾟ)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/㎡ d1 、ドキソルビシン50mg/㎡ d2 、 オンコビン 1.4mg/㎡ d2 、 エンドキサン 750mg/㎡ d2

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	375	mL/㎡	50→100→150mL/hで	○				
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)	○				
		1日1回								
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)								
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整								
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用								
		最大投与速度400mL/h								
		無菌製剤処理料1								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○				
		1日1回								
		流し								
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	開始速度20mL/h		○			
		1日1回								
		投与速度適宜調整し、流しにも使用								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○			
		アロキシ静注0.75mg	1	V			○			
		1日1回								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○			
	☆	ドキソルビシン注	50	mg/㎡			○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	全開		○			
	☆	オンコビン注	1.4	mg/㎡			○			
		1日1回								
		オンコビン最大投与量 2mg/body								
		無菌製剤処理料1								
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間		○			
	☆	エンドキサン注	750	mg/㎡			○			
		1日1回								
		無菌製剤処理料1(揮発性)								
		休薬完了						●		
		以下別オーダー								
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1					
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1					
		1日1回 リツキシマブの30分前に								
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day2-6					
		1日2回 朝昼食後								