治療スケジュール

J-11

*レジメン名	R-CHOP(d1)療法(IR有)(21日間)(悪性ﾘﾝﾊﾟ)
*投与量・投与日	リツキシマブ 375mg/㎡D1, ドキソルビシン 50mg/㎡D1,オンコビン1.4mg/㎡D1,エンドキサン750mg/㎡D1,プレドニン(5)20錠分2D1-5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	337.5	ml/㎡	50→100→150mL/hで	○						
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/㎡	(30分毎50mL/h up)	○						
		1日1回										
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)										
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整										
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン服用										
		最大投与速度400mL/h										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○						
		グラニセトロン静注液1mg	1	A		○						
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	ml	30分	○						
	☆	ドキソルビシン	50	mg/㎡		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	ml	全開	○						
	☆	オンコビン	1.4	mg/㎡		○						
		1日1回										
		オンコビン最大投与量　2mg/body										
		無菌製剤処理料1										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	ml	2時間	○						
	☆	エンドキサン	750	mg/㎡		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1(揮発性)										
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	ml	15分	○						
		1日1回										
		流し										
		休薬完了					●					
		以下別オーダー										
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1							
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1							
		1日1回　リツキシマブ投与30分前										
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5							
		1日2回　朝昼食後										