治療スケジュール

J-110

*レジメン名	DBd療法(皮下)(1-3ｺｰｽ目)(21日間)(MM)
*投与量・投与日	ダラツムマブ 1,800mg day1、ボルテゾミブ 1.3mg/㎡ day1,4,8,11、デキサメタゾン 20mg day1,2,4,5,8,9,11,12

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(4)	d(8)	d(11)	d(15)	d(16)	d(21)
皮下注射	☆	ダラキューロ	1800	mg	3～5分	○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
		ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前にｶﾛﾅｰﾙ,ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ服用										
皮下注射	☆	ベルケイド	1.3	mg/㎡	数秒	○	○	○	○			
		生理食塩水20ml	1	A	(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ溶解用)	○	○	○	○			
		1Vあたり生食1.2mLで溶解すること										
		無菌製剤処理料1										
		休薬完了										●
		以下別オーダー										
内服	☆	レナデックス錠5mg　(ﾃﾞｷｻﾒﾀﾞｿﾞﾝ)	20	mg/day	day,12,4,5,8,9,11,12							
		1日1回朝食後										
		※75歳を超える、過少体重(BMI:18.5kg/㎡未満)、ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良のDM又はｽﾃﾛｲﾄﾞ療法に対する忍容性がない、もしくは有害事象が発現した患者は省略可。										
		カロナール錠500mg	2	錠	day1							
		ポララミン錠2mg	1	錠	day1							
		1日1回ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前										