治療スケジュール

J-123

*レジメン名	G-CHOP療法(初回)(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ 1000mg/body d1,8,15、ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ 50mg/㎡ d2、ｵﾝｺﾋﾞﾝ 1.4mg/㎡ d2、ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ 750mg/㎡ d2

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(8)	d(15)	d(21)	d()	d()	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		1日1回											
		点滴開始30分前にﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ・ｶﾛﾅｰﾙ・ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○						
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V			○						
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分			○	○				
		デキサート注射液	6.6	mg				○	○				
		1日1回											
		点滴開始時にｶﾛﾅｰﾙ・ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ内服											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分			○	○				
		1日1回											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	210	mL	(day1) 12.5mL/hで開始	○		○	○				
	☆	ガザイバ点滴静注	1000	mg/body	(day8・15) 25mL/hで開始可能	○		○	○				
		1日1回											
		生食250mLから40mL抜き、210mLとして使用											
		(day1) 12ml/hで開始、30分毎up(12→25→37→50→62→75→87→100mL/h)、最大100mL/h											
		(day8・15) 前回の投与でIRがgrade1以下の場合、医師の指示によって25mL/hで開始可能、30分毎25mL/h up、最大100mL/h											
		0.2又は0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○						
	☆	ドキソルビシン注	50	mg/㎡			○						
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	全開		○						
	☆	オンコビン注	1.4	mg/㎡			○						
		1日1回											
		オンコビン最大投与量 2mg/body											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間		○						
	☆	エンドキサン注	750	mg/㎡			○						
		1日1回											
		無菌製剤処理料1(揮発性)											
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○				
		1日1回											
		休薬完了								●			
		以下別オーダー											
内服		カロナール錠(500mg)	1	錠	day1,8,15								
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1,8,15								
		1日1回 ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与60分前											
内服	☆	プレドニン錠(5mg)	100	mg/body	day1-5								
		1日2回 朝昼食後											
		(day1)ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ投与60分前											
内服		バクタ配合錠	1	錠	day1-21								
		1日1回 朝食後											