治療スケジュール

J-134

*レジメン名	ESHAP療法(21日間)(悪性リンパ腫)
*投与量・投与日	エトポシド 40mg/㎡ day1-4, シスプラチン 25mg/㎡ day1-4, シタラビン 2000mg/㎡ day5, メチルプレドニゾロン 250mg/body day1-5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(21)	d()	d( )
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○							
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V		○							
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	15分	○	○	○	○				
	☆	ソル・メドロール静注用	250	mg/body		○	○	○	○				
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	15分					○			
	☆	ソル・メドロール静注用	250	mg/body						○			
		1日1回											
		シスプラチン投与終了後に開始											
		ルート②											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○				
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○	○	○				
	☆	エトポシド点滴静注液	40	mg/㎡		○	○	○	○				
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		エトポシド濃度0.4mg/mLを超える場合は											
		0.4mg/mL以下になるよう生食追加											
		ルート①											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		エトポシド投与終了後に開始											
		ルート②											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	23時間	○	○	○	○				
	☆	シスプラチン点滴静注	25	mg/㎡		○	○	○	○				
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		点滴バックを遮光すること											
		ルート②											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間					○			
	☆	キロサイドN注	2000	mg/㎡						○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		ルート②											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○				
		1日1回											
		流し											
		ルート①											
中心静脈注射 メインルート		生理食塩液	50	mL	15分					○			
		1日1回											
		流し											
		ルート②											
		休薬完了									●		
		以下別オーダー											
内服		オランザピン錠	5	mg	day1～4	○	○	○	○				
		1日1回夕食後											
点眼		ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNaPF眼耳鼻科用液0.5%			day5 6時からday6 6時まで6時間ごとに投与					○			
		1日4回 両目											