治療スケジュール

J-135

*レジメン名	R-ESHAP療法（初回・IR有）（21日間）（悪性リンパ腫）
*投与量・投与日	リツキシマブ 375 mg/㎡day1、エトポシド 40mg/㎡ day1-4, シスプラチン 25mg/㎡ day1-4, シタラビン 2000mg/㎡ day5, メチルプレドニゾロン 250mg/body day1-5

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d（1）	d（2）	d（3）	d（4）	d（5）	d（21）	d（）	d（ ）
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	337.5	mL/㎡	50→100→150mL/hで	○							
	☆	リツキシマブBS注	375	mg/m2	（30分毎50mL/h　up）	○							
		１日１回											
		50→100→150mL/hで(30分毎50mL/h up)											
		最大投与速度400mL/h											
		リツキシマブ1mg/mLに濃度調整											
		リツキシマブ投与30分前にカロナール、ポララミン内服											
		無菌製剤処理料1											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○							
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V		○							
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	15分	○	○	○	○				
	☆	ソル・メドロール静注用	250	mg/body		○	○	○	○				
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	15分					○			
	☆	ソル・メドロール静注用	250	mg/body						○			
		1日1回											
		シスプラチン投与終了後に開始											
		ルート②											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○				
		1日1回											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○	○	○				
	☆	エトポシド点滴静注液	40	mg/㎡		○	○	○	○				
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		エトポシド濃度0.4mg/mLを超える場合は											
		0.4mg/mL以下になるよう生食追加											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○							
		1日1回											
		エトポシド投与終了後に開始											
		ルート②											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	23時間	○	○	○	○				
	☆	シスプラチン点滴静注	25	mg/㎡		○	○	○	○				
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		点滴バックを遮光すること											
		ルート②											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間					○			
	☆	キロサイドN注	2000	mg/㎡						○			
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		ルート②											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○				
		1日1回											
		流し											
		ルート①											
中心静脈注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分					○			
		1日1回											
		流し											
		ルート②											
		休薬完了										●	
		以下別オーダー											
内服		カロナール錠（500mg）	1	錠	day1								
		ポララミン錠（2mg）	1	錠	day1								
		1日1回　リツキシマブ投与30分前に											
内服		オランザピン錠	5	mg	day1～4	○	○	○	○				
		1日1回夕食後											
点眼		ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNaPF眼耳鼻科用液0.5%			day5 6時からday6 6時まで6時間ごとに投与								
		1日4回　両目											