治療スケジュール

J-143

*レジメン名	DLd療法(皮下)(1～2ｺｰｽ目)(28日間)(MM)
*投与量・投与日	ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ1800mg day1,8,15,22、ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ25mg/body day1～21、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ20mg/body day1,2,8,9,15,16,22,23

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )	d( )	d( )
皮下注射	☆	ダラキューロ配合皮下注	1800	mg	3～5分	○	○	○	○					
		1日1回												
		無菌製剤処理料1												
		15mLを約3～5分かけて(翼状針を使用)												
		臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下(1,4,7,10時方向)に投与												
		投与部位は前回と同一部位を避けるため、時計回りに部位を変える。												
		ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前にカロナール,ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ,レナﾃﾞｯｸｽ服用												
		休薬完了								●				
		以下別オーダー												
内服	☆	レナリドミドカプセル(5mg)	25	mg	day1～21									
		1日1回　朝食後			(day22～28休薬)									
		レナリドミドはCCrに準じて減量。												
内服	☆	レナデックス錠(4mg)　　(ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	20	mg	day1,2,8,9,15,16,22,23									
		1日1回　朝食後												
		day1,8,15,22は、ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前に内服。												
		75歳を超える又は過少体重(BMI18.5kg/㎡未満)ではﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝを20mg/週に減量。												
内服		カロナール錠(500mg)	2	錠	day1,8･15･22									
		ポララミン錠(2mg)	1	錠	day1,8･15･22									
		1日1回 ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ投与60分前												
内服														